1
2
3
4
5ml

Correction cap
Transparent Correction Cap
Design Safe PP Material
Traction hose
Safe Silica Gel Material for Hose
Vacuum valve
Safe PP Material for
Integrated Design

external diameter 30mm



internal diameter 15mm

木西米

MU XI MI · 净产

NIPPLE CORRECTOR

PRODUCT FEATURES

• SIMPLE OPERATION AND PAINLESS USE IS THE BEST WAY TO SOLVE THE DEPRESSION AFTER THE FLAT RECOVERY OF THE NIPPLE
TRACTION CORRECTION WILL NOT HARM THE BREAST TUBE, WILL NOT REBOUND AFTER REHABILITATION, CAN SUCCESSFULLY BREASTFEED
• ORTHOTICS CAN BE CORRECTED IN THE CASE OF UNDERWEAR, AND CAN BE WORN DURING THE DAY AND NIGHT
• PERMANENT CORRECTION OF THE PROBLEM OF FLAT INDENTATION OF THE NIPPLE, WHICH DOES NOT REBOUND AFTER REHABILITATION

MATTERS NEEDING ATTENTION

• USE FIRST FEW TIMES FOR THE FIRST TIME, THE STRENGTH OF COMFORT IS APPROPRIATE
• SHOULD NOT BE WORN FOR MORE THAN 2 HOURS EACH TIME, ACCUMULATING ABOUT 8 HOURS PER DAY
• AS MUCH AS POSSIBLE TO MORE THAN 1/2, NEGATIVE PRESSURE GREATER SUCTION IS BETTER
NIPPLE CORRECTION, EXPENSIVE PERSISTENCE, THE MORE FREQUENT CORRECTION, THE SOONER THE EFFECT
(FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE INSTRUCTIONS)

MATTERS NEEDING ATTENTION

[Frequently Asked Questions and Answers]

The pump is not smooth to plug in. After the syringe is inserted into the valve, it must be rotated slightly and tightened.

The orthopaedic is easy to loosen with suction. This situation is caused by too little suction. Your nipple must absorb more than half, so that the suction is more stable, too small suction can easily lead to fall off; Or when pulling the syringe, air reflux occurs and the negative pressure decreases. This situation can be avoided by improving the details of the lower syringe; In addition, some cream(emulsion / aloe gel, etc.) can also be applied to the nipple to help the suction is more stable.

There is a liquid outflow. The nipple contains a breast tube. Individual female nipples are relatively sensitive. Once stimulated, they easily secrete the same liquid as "juice". This is a normal phenomenon. When correcting the suction is not so large, reducing the wearing time can reduce the appearance of this situation.

There are blisters or bleeds. This is a single correction suction too large, too long lead, it is recommended that the suction is not so large, the first few times can be carried out many times.

There is milk instability in the lactation period. Lactation nipple correction easy to secrete milk is a normal situation, milk production will reduce the negative pressure inside, the phenomenon of instability. It is recommended that the user correct the breast after breastfeeding or emptying the breast, so that the suction is better.

The nipple retracts after the orthodontic device is removed. Physical traction is a gradual recovery process. Depending on the degree of subsidence, correction of about 1 to 3 months will not be able to completely recover. The nipple correction wants to have the confidence to oneself, expensive is insisting, perfect nipple is waiting for you Yo!

DESCRIPTION

[Method of use]

1, insert the syringe into the Corrector valve (slightly tightened) to the valve white plug head open some. (as shown below)

2, the suction of the correction device can be controlled by itself, the strength to comfort is not painful, do not pull too hard, but also appropriate application of some cream, this will help the suction more stable. (as shown below)

After the nipple is sucked into the ideal form, let the correction cap attached to the hose stick to the breast, and then hold one end of the valve and remove the syringe. (as shown below)



USE OF RECOMMENDATIONS

1. 5 days before the use of each suction can be about 10 to 20 minutes, 2 to 3 times a day, so that the nipple first adapt to the pull environment;

2.After the nipple adapts, it can appropriately extend the correction time and increase the correction frequency every day. (The wearing time should not exceed 2 hours each time, so that the correction is more comfortable);

3. the more frequently nipple correction training, the better the rehabilitation effect, the faster the effect.

木西米

MU XI MI · 孕产

乳头矫正器

产品特点

- 操作简单，使用无痛，是解决乳头扁平康复之后凹陷的最佳方法
- 牵引式矫正不会伤害乳腺管，康复之后不会反弹，可以顺利哺乳
- 矫正器可以在穿着内衣的情况下进行矫正，白天晚上都可以佩戴
- 永久性矫正乳头扁平内陷的问题，康复之后不会反弹

注意事项

- 初次使用先少时多次，力度以舒适为宜
- 每天坚持使用2-3次每次10-20分钟
- 尽量吸到1/2以上，负压更大吸力更好
- 乳头矫正，贵在坚持，矫正越频繁，见效越早

（更多注意事项详见说明书）

产品基本信息

枣庄莘贝缘商贸有限公司出品

品名：乳头矫正器

产品材质：PP（聚丙烯）+硅胶

产地：山东　保质期：五年

地址：山东省枣庄市峄城区榴园镇生态园13号

执行标准：GB/T 32094-2015

RTJZQ201

6 974175 650008

mellbimbó korrektor

kínai → magyar

Jellemzők

· Egyszerűen kezelhető és fájdalommentes, ez a legjobb módja annak, hogy megoldja a beesett mellbimbók problémáját, miután felépült az ellaposodásból.

·A tapadáskorrekció nem károsítja a mellcsatornákat, és nem fog visszapattanni a felépülés után, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes szoptatást.

·A fogszabályzó fehérnemű viselése közben korrigálható, és nappal és éjszaka is viselhető.

·Véglegesen kijavítja a lapos és fordított mellbimbók problémáját, amelyek gyógyulás után nem fognak visszapattanni

---

Óvintézkedések

·Első használatkor egyszerre többször használd, és az erő is kényelmes legyen.

· Használja naponta 2-3 alkalommal 10-20 percig

· Próbáljon 1/2-nél többet szívni, minél nagyobb a negatív nyomás, annál jobb lesz a szívóerő.

·A mellbimbó korrekciójának kulcsa a kitartás. Minél gyakoribb a korrekció, annál hamarabb láthatók

az eredmények (további óvintézkedésekért lásd az utasításokat)

---

alapvető termékinformációk

Gyártó: Zaozhuang Xinbeiyuan Trading Co., Ltd.

RTJZQ201

Termék neve: Mellbimbó korrektor

Termék anyaga: PP (polipropilén) + szilikon

Származási hely: Shandong Felhasználhatósági idő: öt év

Cím: No. 13, Ecological Park, Liuyuan Town, Yicheng District, Zaozhuang City, Shandong tartomány

Megvalósítási szabvány: GB/T 32094-2015

6 974175 650008

注意事项

- 孕期用户，怀孕3-8个月可以正常使用，其它月份建议少用或不用；
- 哺乳期用户，建议在排空乳房或者喂奶后进行矫正，这样吸力更好；
- 矫正期间可以穿宽松的内衣，避免做剧烈运动，尽量减少摩擦导致的产品松动；
- 矫正器可以用酒精擦拭消毒，或用清水清洗即可。PS：阀门是精密医疗配件，请勿高温烫洗。空气阀进液体及时清理不然时间久会腐蚀内部结构影响气密性。

【常见问题及解答】

☆**针筒插上出气不顺畅。**针筒插进阀门之后还要稍微用力旋转一下，然后拧紧就可以了。

☆**矫正器吸上容易松掉。**这个情况是由吸力过小导致的。您乳头要吸到一半以上，这样吸力才更稳，吸力过小容易导致脱落；或拔针筒的时候出现空气回流导致负压减小也容易出现松动，此情况您可以改善下卸针筒的细节即可避免；另外，也可在乳头上抹些护乳霜（乳液/芦荟胶等），这样有助于吸的更稳。

☆**佩戴有液体流出。**乳头内含乳腺管，个别女性乳头相对敏感，一经刺激容易分泌“汁”一样的液体，这个是正常现象。矫正的时候吸力不要那么大，减短佩戴时间就可以减少这个情况的出现了。

☆**有水泡或出血。**这个是单次矫正吸力过大、时间过长导致，建议吸力不要那么大，先少时多次地进行就可以了。

☆**哺乳期有奶水吸不稳。**哺乳期乳头矫正容易分泌奶水是正常情况，奶水的泌出会减小里面的负压，出现吸不稳的现象。建议用户在喂奶后或排空乳房后进行矫正，这样吸力更好。

☆**矫正器取下后乳头会回缩。**物理式牵引矫正是个循序渐进的康复过程，视不同内陷程度，一般坚持1~3个月左右的矫正就不会回缩能彻底康复了。乳头矫正要对自己有信心，贵在坚持，完美乳头正在等着您哟！

kínai → magyar

Óvintézkedések

·Terhes felhasználóknak a terhesség 3-8 hónapja alatt rendesen használható, más hónapokban kevesebb vagy egyáltalán nem ajánlott;

·Szoptató felhasználóknak a szoptatás vagy szoptatás után javasolt korrekciót végezni, hogy jobb legyen a szívóerő;

·A korrekciós időszak alatt bő fehérneműt viselhet, kerülheti a megerőltető testmozgást, és minimalizálhatja a termék súrlódás miatti kilazulását;

*A fogszabályzó alkohollal törölhető és fertőtleníthető, vagy vízzel lemosható. PS: A szelep egy precíziós orvosi tartozék. Kérjük, ne mossa magas hőmérsékleten. Ha folyadék kerül a levegőszelepbe, azonnal tisztítsa meg. Ellenkező esetben idővel a belső szerkezet korrodálódik, és ez befolyásolja a léptömörséget.

[GYIK és válaszok]

☆A fecskendő be van helyezve, és a levegőkimenet nem sima. Miután behelyezte a fecskendőt a szelepbe, kissé forgassa el, majd húzza meg.

☆A korrektor felszívás után könnyen kilazítható.Ez a helyzet a túl kicsi szívóerőből adódik.A mellbimbót az út több mint felénél be kell szívni,hogy a szívóerő stabilabb legyen.Túl nagy a szívóerő kicsi és könnyen leeshet;vagy légáramlás fordulhat elő a fecskendő kihúzásakor Könnyen meglazítható, ha csökken a negatív nyomás.Ezt a helyzetet elkerülheti, ha javítja a fecskendő eltávolításának részleteit. , a mellbimbóra is kenhetsz valamilyen védőkrémet (lotion/aloe vera gél stb.) ami segít a szívásban Stabilabb.

☆ Viselés közben folyadék szivároghat ki. A mellbimbók emlőcsatornákat tartalmaznak.Néhány női mellbimbó viszonylag érzékeny.Stimulálás után könnyen "lé"szerű folyadékot választanak ki.Ez normális jelenség.A szívóerő nem lehet olyan erős a korrekció során.A viselési idő lerövidítése csökkentheti ennek a helyzetnek az előfordulását.

☆Ha hólyagok vagy vérzések vannak, ezt az okozza, hogy az egyszeri korrekciós szívóerő túl erős, és az idő túl hosszú. Javasoljuk, hogy a szívóerő ne legyen olyan erős, és csak többször kell megtenni .

☆Normális, ha a tejszívás instabil szoptatás alatt. Normális, ha a mellbimbó korrekciója szoptatás alatt elősegíti a tejelválasztást. A tejelválasztás csökkenti a belső negatív nyomást és instabil szívást okoz. Javasoljuk, hogy a felhasználók végezzék el ezt az eljárást szoptatás vagy mellürítés után.Korrekció, így jobb a szívóerő,

☆A mellbimbó a korrektor eltávolítása után visszahúzódik. A fizikai tapadáskorrekció egy lépésről lépésre történő helyreállítási folyamat. Az inverzió mértékétől függően, általában ha körülbelül 1-3 hónapig kitart a korrekció mellett, nem húzódik vissza, és Ön A mellbimbó korrekciója megköveteli Bízz magadban és tarts ki, a tökéletes mellbimbók várnak rád!

使用说明书

【使用方法】

1、将针筒插入矫正器阀门（稍为用力拧紧）把阀门内白色堵头顶开一些。（如下图1）

2、矫正器的吸力可以自己控制，力度以舒适不痛为宜，不要拉的太用力，也可适当涂抹些护乳霜，这样有助于吸的更稳。（如下图2）

3、乳头被吸到理想的形态后，让连接在软管的矫正帽吸牢在乳房上，然后再摁住气阀的一端，将针筒取下即可。（如下图3）



使用建议

1、使用前5天每次吸10~20分钟左右即可，每天2~3次，让乳头先适应牵拉环境；

2、乳头适应之后，每天可以适当延长矫正时间及增加矫正的频率。（每次佩戴时间不要超过2小时，这样矫正更舒适）；

3、乳头矫正训练越频繁，康复效果就越好，见效就越快。

kínai → magyar

felhasználói kézikönyv

【Utasítás】

1. Helyezze be a fecskendőt a korrektor szelepbe (enyhén húzza meg), és nyissa ki a szelep fehér dugóját. (1. ábra lent)

2. A korrektor szívóerejét saját kezűleg szabályozhatod.Erőssége legyen kényelmes és ne legyen fájdalmas.Ne húzd túl erősen.Megfelelően alkalmazhatsz valamilyen védőkrémet is,amivel stabilabb lesz a szívás. (2. kép lent)

3. Miután a mellbimbót az ideális formára szívta, hagyja, hogy a tömlőhöz csatlakoztatott korrekciós kupakot erősen felszívja a mellre, majd nyomja meg a levegőszelep egyik végét és vegye ki a fecskendőt. (3. ábra lent)

Ajánlások

1. Szívjon kb. 10-20 percig minden alkalommal a használat első 5 napjában, naponta 2-3 alkalommal, hogy a mellbimbó alkalmazkodjon a nyújtási környezethez;

2. A mellbimbók adaptációja után a korrekciós idő megfelelően meghosszabbítható és a korrekció gyakorisága minden nap növelhető. (Ne viselje 2 óránál tovább minden alkalommal, hogy kényelmesebb legyen a korrekció);

3. Minél gyakoribb a mellbimbókorrekciós edzés, annál jobb lesz a helyreállítási hatás, és annál gyorsabbak az eredmények.